	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 01
		Vers. 01	Pag.
Higienização Simples das Mãos		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: 1- Orientar a técnica correta da higienização das mãos, conscientizando os profissionais sobre a importância da mesma, a fim de prevenir a transmissão de infecções. 2- Incentivar a prática diária de bons hábitos,			
Setor: Todos os Setores Do Hospital Veterinário da UFPR		Agentes: Comunidade do Hospital Veterinário da UFPR	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Abrir a torneira. 2. Molhar as mãos, evitando encostar na pia. 3. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos. 4. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 5. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa), entrelaçando os dedos. 6. Entrelaçar os dedos friccionando os espaços interdigitais. 7. Esfregar o dorso dos dedos de mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos, com movimento de vai e vem. 8. Esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa). 9. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimentos circular. 10. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular. 11. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. 12. Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. 			
PERIODICIDADE			
Realizar seguindo a regras dos 5 momentos da higienização das mãos que são: <ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de tocar o paciente; 2. Antes de realizar procedimento limpo. 3. Após o risco de exposição a fluidos corporais. 4. Após tocar o paciente. 5. Após tocar superfícies próximas ao paciente. 			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Água, sabonete líquido e papel toalha			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
<ol style="list-style-type: none"> 1) Realizar a mesma técnica com o álcool, se as mãos estiverem limpas, antes e após procedimentos, contato com pacientes e superfícies 2) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH. 3) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH. 			
Sigla			

01- CCIH- Comissão de Controle de infecção Hospitalar

Referências

01- ANVISA. MANUAL. Série – Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília, 2013

02- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. 2017, 122p

ANEXOS

HIGIENIZE AS MÃOS: SALVE VIDAS

Higienização Simples das Mãos



1. Abra a torneira e molhe as mãos, evitando encostar na pia.



2. Aplique na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante).



3. Ensaboe as palmas das mãos, friccionando-as entre si.



4. Esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda (e vice-versa) entrelaçando os dedos.



5. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais.



6. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta (e vice-versa), segurando os dedos, com movimento de vai-e-vem.



7. Esfregue o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda (e vice-versa), utilizando movimento circular.



8. Friccione as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha (e vice-versa), fazendo movimento circular.



9. Esfregue o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita (e vice-versa), utilizando movimento circular.



10. Enxágue as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evite contato direto das mãos ensaboadas com a torneira.




11. Seque as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos.

Para a técnica de Higienização Anti-séptica das mãos, seguir os mesmos passos e substituir o sabonete líquido comum por um associado a anti-séptico.



Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 08/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 02
		Vers. 01	Pag.
Precaução Padrão		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Prevenir a transmissão de microrganismos			
Setor: Unidades de internação, Ambulatórios, Área suja da lavanderia, Setor exames de imagem, Centro Cirúrgico de Pequenos Animais, Centro Cirúrgico de Grandes Animais, UTI, Laboratório, Reprodução Grandes Animais, Odontologia, Necrópsia.		Agentes: Toda comunidade do Hospital Veterinário da UFPR	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Usar precaução padrão para todos os pacientes. 02- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01. 03 Usar luvas de procedimento frente a risco de contaminação com fluídos corporais. 04- Usar máscara e óculos, a fim de proteger olhos, nariz e boca, durante procedimentos, com risco de contaminação com fluídos corporais. 05- Usar avental de contato, sempre que houver risco de contaminação com fluídos corporais. 06- Retirar EPI ao término da realização dos procedimentos, descartando-os em local apropriado. 07- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01			
PERIODICIDADE			
Sempre que manusear paciente, independente do seu diagnóstico.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI, pia, água, sabão líquido, álcool 70%			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01. 2) Retirar luvas imediatamente após o término do procedimento, descartando-as em lixo hospitalar. 3) Retirar o avental de contato e pendurá-lo com técnica correta, se não houver sujidade. 4) Desprezar o avental após 6 horas de uso ou antes se houver sujidade, em local apropriado. 5) Desprezar a máscara em lixo hospitalar. 6) Realizar desinfecção dos óculos, após o uso, com álcool 70%, guardando-o em local apropriado. 7) Manter agulhas usadas nas seringas descartáveis, não retirá-las e nunca reencapá-las. O descarte desses materiais deverá ser em caixa de perfurocortantes. 8) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH. 9) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.			
Siglas			
UTI- Unidade Terapia Intensiva EPI- Equipamento Proteção Individual. CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar ANVISA- Agência Nacional Vigilância Sanitária			
Referências			
01- ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de Superfícies. Editora ANVISA, 1ª edição. Brasília 2010.			

02- PORTARIA N.º37, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2002.

03- MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma Regulamentadora 32, de 16 de novembro de 2005

ANEXOS



Higienização das mãos



Luvas e Avental




Óculos e Máscara



Caixa perfuro-cortante

Fonte: Cartaz de Precauções. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 2007.

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 10/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. Nº:	E 03
		Vers. 01	Pag.
Precaução Contato		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Evitar a transmissão de microrganismos no ambiente hospitalar e entre os pacientes.			
Setor: Unidades de internação, Ambulatórios, Área suja da lavanderia, Setor exames de imagem, Centro Cirúrgico de Pequenos Animais, Centro Cirúrgico de Grandes Animais, UTI, Laboratório, Reprodução Grandes Animais, Odontologia, Necrópsia.		Agentes: Toda comunidade do Hospital Veterinário da UFPR	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Usar precaução contato para todos os pacientes infectados. 02- Usar precaução de contato frente a materiais e roupas infectadas. 03- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01. 03 Usar luvas de procedimento sempre que manusear o paciente. 04- Usar máscara e óculos, a fim de proteger olhos, nariz e boca, durante procedimentos, se houver risco de contaminação com fluídos corporais. 05- Usar avental de contato, sempre que manusear o paciente. 06- Retirar EPI ao término da realização dos procedimentos, descartando-os em local apropriado. 07- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01			
PERIODICIDADE			
Sempre que manusear paciente infectado.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI, pia, água, sabão líquido, álcool 70%			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01. 2) Retirar luvas imediatamente após o término do procedimento, descartando-as em lixo hospitalar. 3) Retirar o avental de contato e pendurá-lo com técnica correta, se não houver sujidade. 4) Desprezar o avental após 6 horas de uso ou antes se houver sujidade, em local apropriado. 5) Desprezar a máscara em lixo hospitalar. 6) Realizar desinfecção dos óculos, após o uso, com álcool 70%, guardando-o em local apropriado. 7) Manter agulhas usadas nas seringas descartáveis, não retirá-las e nunca reencapá-las. O descarte desses materiais deverá ser em caixa de perfurocortantes. 8) Manter preferencialmente em quarto privativo. 9) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH. 10) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.			
Siglas			
UTI- Unidade Terapia Intensiva EPI- Equipamento Proteção Individual.			

CCIH- Comissão Controle Infecção Hospitalar
ANVISA- Agência Nacional Vigilância Sanitária

Referências

- 01- ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de Superfícies. Editora ANVISA, 1ª edição. Brasília 2010.
02- PORTARIA N.º37, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2002.
03- MINISTÉRIO DO TRABALHO. Norma Regulamentadora 32, de 16 de novembro de 2005

ANEXOS



Fonte: Cartaz de Precauções. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 2007.
Sinalizar - Mega Visual Arte e Design Ltda

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 10/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO-POP
Hospital Veterinário/UFPR**

Pop. E 04
Nº:
Vers. Pag.
01

Limpeza de Ambientes não críticos

Próxima Revisão:
01/2025

Objetivo: Realizar limpeza adequada, com técnica correta, para manter segurança e bem estar.

Setor: Administrativo, Almoxarifado, Hall, Salão, Auditórios, Refeitório, Copa, Sala de aula, Área externa.

Agentes: Encarregado da limpeza e Auxiliar da higiene.

ETAPAS DO PROCEDIMENTO

1. Encarregado da Limpeza

Orientar a equipe de higiene para realização da rotina de limpeza dos ambientes

2. Auxiliar de higiene

Diariamente

- 01- Separar os materiais e produtos que serão usados.
- 02- Colocar EPI.
- 03- Retirar o lixo.
- 04- Limpar todos os móveis com pano umedecido e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 05- Limpar o piso com pano e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 06- Limpar os dispensers de álcool, externamente, com pano e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 07- Descartar as fibras utilizadas no lixo comum.
- 08- Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados.
- 09- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.

Semanalmente

- 01- Separar os materiais e produtos que serão usados.
- 02- Colocar EPI.
- 03- Limpar portas, caixilhos e maçanetas com pano umedecido em detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 04- Limpar todos os lados dos móveis, externamente, com pano umedecido e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 05- Limpar as lixeiras com detergente neutro e fibra. Enxaguar e secar completamente e recolocar o saco de lixo.
- 06- Limpar o piso com fibra e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 07- Lavar os dispensers de álcool, interna e externamente, com fibra e detergente neutro. Enxaguar, secar completamente e passar álcool 70%. Realizar a identificação corretamente.
- 08- Descartar as fibras utilizadas no lixo comum.
- 09- Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados
- 10- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.

Quinzenalmente

- 01- Separar os materiais e produtos que serão usados.
- 02- Colocar EPI.

- 03- Realizar limpeza leve do piso com removedor. Enxaguar, secar completamente e passar cera.
- 04- Limpar os vidros, internamente com limpa vidro ou pano umedecido em detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 05- Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados.
- 06- Anotar o trabalho em impresso próprio.

Mensalmente

- 01- Separar os materiais e produtos que serão utilizados.
- 02- Colocar EPI.
- 03- Limpar as paredes e tetos em um único sentido (parede: de cima para baixo) e (teto: de dentro para fora) com detergente neutro e fibra. Enxaguar e secar completamente.
- 04- Descartar as fibras utilizadas no lixo comum.
- 05- Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados.
- 06- Anotar o trabalho em impresso próprio.

Bimestralmente

- 01- Separar os materiais e produtos que serão utilizados.
- 02- Colocar EPI
- 03- Limpar sujidade de cortinas ou persianas com fibra e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 04- Limpar luminárias e janelas com pano úmido e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 05- Limpar vidros, externamente, com limpa vidro ou pano umedecido em detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.
- 06- Descartar as fibras utilizadas no lixo comum.
- 07- Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados.
- 08- Anotar o trabalho em impresso próprio.

PERIODICIDADE

A limpeza deverá ser realizada de acordo com o cronograma.

FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

EPI, rodo, pá, balde, panos para limpeza, fibra, placa de sinalização e produtos padronizados pela CCIH.

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

- 1) O Equipamento de Proteção Individual deverá ser composto de uniforme, sapato, óculos e luvas próprias, fornecidos pela empresa terceirizada.
- 2) Na limpeza utilizar a técnica dos 2 baldes (preferencialmente de cores diferentes), que consiste em ter um balde com o produto e o outro com água limpa.
- 3) Não varrer o piso a seco, a varredura deve ser sempre úmida e, em um único sentido (nunca em vaivém) , com rodo e pano úmido, a fim de evitar a dispersão de pó.
- 4) Separar os panos de limpeza de superfícies móveis e fixas.
- 5) Banheiros ver POP nº E 07
- 6) Lavar sempre as mãos antes e após a realização das atividades, conforme POP nº E 01.
- 7) Produtos padronizados pela CCIH são: álcool 70% e detergente neutro
- 8) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH.
- 9) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.


Siglas

- 01- EPI- Equipamentos Proteção Individual
02- CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Referências

- 01- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.
02- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012
03- Ministério da Saúde. PORTARIA N° 3.012, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2009

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 02/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 05
		Vers. 01	Pag.
Limpeza de Ambientes Semicríticos		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Realizar limpeza adequada, com técnica correta, para prevenir infecção hospitalar.			
Setor: Unidades de Internação, Ambulatórios, Nutrição, Farmácia, Recepção, Área limpa da Lavanderia e Setor de Exames de Imagem.		Agentes: Encarregado da limpeza e Auxiliar da higiene.	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>1. Encarregado da Limpeza</p> <p>2. Orientar a equipe de higiene para realização da rotina de limpeza e desinfecção dos ambientes</p> <p>2. Auxiliar de higiene</p> <p>01- Separar os materiais e produtos que serão usados.</p> <p>02- Colocar EPI.</p> <p style="text-align: center;"><i>Limpeza concorrente</i></p> <p>03- Retirar o lixo.</p> <p>04- Limpar as paredes e tetos em um único sentido(de cima para baixo parede) e (de dentro para fora o teto) com detergente neutro, fibra e produto padronizado pela CCIH. Enxaguar e secar completamente.</p> <p>05- Limpar portas, caixilhos e maçanetas com fibra e detergente. Enxaguar e secar completamente.</p> <p>06- Limpar os vidros com pano e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente. Passar álcool 70%</p> <p>07- Limpar sujidade de cortinas/persianas e telas, com fibra e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.</p> <p>08- Limpar todos os móveis com pano umedecido e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente.</p> <p>09- Limpar as lixeiras com detergente neutro e fibra. Enxaguar, secar completamente e recolocar o saco de lixo.</p> <p>10- Limpar sujidade (fezes, sangue, urina, secreções) com papel toalha e descartar no lixo infectante. Lavar o piso com detergente e fibra. Enxaguar, secar completamente e realizar desinfecção com produto padronizado.</p> <p>11- Lavar os dispenser (álcool, sabonete) e os suportes de papel toalha, externamente, com pano e detergente neutro. Enxaguar e secar completamente. Passar álcool 70%</p> <p>12- Descartar as fibras utilizadas no lixo infectante. Realizar a limpeza do material utilizados. Encaminhar os panos para lavanderia, afim de serem higienizados.</p> <p>13- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.</p> <p style="text-align: center;"><i>Limpeza terminal</i></p> <p>03-Realizar a limpeza nas paredes e tetos em um único sentido (de cima para baixo as paredes) e (dentro para fora o teto), utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente.</p> <p>04- Realizar a limpeza de portas, caixilhos e maçaneta, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente.</p> <p>05-Realizar a limpeza vidros e janelas, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo e seco.</p>			

06-Realizara limpeza de cortinas, persianas e telas, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo e seco se necessário.

07- Realizar a limpeza dos móveis, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%.

08-Realizara limpeza das lixeiras, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e recolocar saco de lixo.

09- Realizara limpeza dos dispensers, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%.

Realizar a reposição de papel toalha, álcool 70% e sabonete líquido.

Descartar as fibras utilizadas no lixo infectante. Realizar a desinfecção do material utilizados. Encaminhar os panos para lavanderia, afim de serem higienizados.

Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.

PERIODICIDADE

A limpeza concorrente deverá ser realizada 2x/dia ou quando necessário.

A limpeza terminal deverá ser realizada 1x/semana ou antes se necessário.

FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

EPI, rodo, pá, balde, panos para limpeza, fibra, placa sinalização e produtos padronizados pela CCIH.

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

- 1) O Equipamento de Proteção Individual deverá ser composto de uniforme, sapato, óculos e luvas próprias, fornecidos pela empresa terceirizada.
- 2) Na limpeza terminal, não realizar o enxague.
- 3) Na limpeza utilizar a técnica dos 2 baldes (preferencialmente de cores diferentes), que consiste em ter um balde com o produto e o outro com água limpa.
- 4) Não varrer o piso a seco, a varredura deve ser sempre úmida e, em um único sentido (nunca em vaivém) , com rodo e pano úmido, afim de evitar a dispersão de microorganismos através do pó.
- 5) Separar os panos de limpeza de superfícies móveis e fixas.
- 6) Os **itens 4, 5, 6 e 7, da limpeza concorrente**, deverão ser realizados em caso de sujidade.
- 7) Na limpeza concorrente, nos casos de sujidade com material biológico, após a limpeza simples, realizar desinfecção com saneante padronizado pela CCIH.
- 8) Na limpeza terminal, antes da desinfecção com saneante padronizado, realizar limpeza simples.
- 9) Limpeza de banheiros ver Pop nº 7.
- 10) Produtos padronizados: Detergente neutro, Álcool 70% , Herbalvet e Hipoclorito de sódio.
- 11) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº 1.
- 12) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH.
- 13) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.


Siglas

- 01- EPI- Equipamentos Proteção Individual
- 02- CCIH- Comissão Controle Infecção Hospitalar

Referências

- 01-- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.
- 02- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012
- 03- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 02/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. E 06
		Vers. 01
Limpeza de Ambientes críticos		Próxima Revisão: 01/2025
Objetivo: Realizar limpeza adequada, com técnica correta, para prevenir infecção hospitalar.		
Setor: Centro Cirúrgico Pequenos Animais, Centro Cirúrgico Grandes Animais, Central Material Esterilizado, UTI, Laboratório, Isolamento, Área suja da Lavanderia, Reprodução de Grandes Animais, Sala Odontologia, Sala Necrópsia		Agentes: Encarregado da limpeza e Auxiliar da higiene.
ETAPAS DO PROCEDIMENTO		
1. Encarregado da Limpeza Orientar a equipe de higiene para realização da rotina de limpeza concorrente e terminal dos ambientes		
2. Auxiliar de higiene 01- Separar os materiais e produtos que serão usados. 02- Colocar EPI 03- Realizar a limpeza nas paredes e tetos em um único sentido (parede: de cima para baixo) e (teto: dentro para fora), utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente. 04- Realizar a limpeza de portas, caixilhos e maçaneta, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente. 05- Realizar a limpeza vidros e janelas, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo e seco. 06- Realizar a limpeza de cortinas, persianas e telas, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo e seco, se necessário. 07- Realizar a limpeza dos móveis, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%. 08- Realizar a limpeza das lixeiras, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e recolocar saco de lixo. 09- Realizar a limpeza dos dispensers, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%. 10- Realizar a reposição de papel toalha, álcool 70% e sabonete líquido. 11- Descartar as fibras utilizadas no lixo infectante. Realizar a limpeza do material utilizados. Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados. 12- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.		
PERIODICIDADE		
A limpeza deverá ser realizada 2x/dia ou quando necessário.		
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS		
EPI, rodo, pá, balde, panos para limpeza, fibra, placa de sinalização e produtos padronizados pela CCIH.		

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

- 1) O Equipamento de Proteção Individual deverá ser composto de uniforme, sapato, óculos e luvas próprias, fornecidos pela empresa terceirizada.
- 2) Na limpeza utilizar a técnica dos 2 baldes (preferencialmente de cores diferentes), que consiste em ter um balde com o produto e o outro com água limpa.
- 3) Não varrer o piso a seco, a varredura deve ser sempre úmida e, em um único sentido (nunca em vaivém), com rodo e pano úmido, afim de evitar a dispersão de microorganismos através do pó.
- 4) Separar os panos de limpeza de superfícies móveis e fixas.
- 5) As salas cirúrgicas deverão receber limpeza nos pisos, após o término de cada cirurgia.
- 6) As salas cirúrgicas deverão receber limpeza geral após a última cirurgia do dia, em caso de paciente infectado ou sala cirúrgica muito utilizada.
- 7) Os produtos padronizados pela CCIH são: álcool 70%, hipoclorito de sódio e Herbalvet
- 8) Limpeza de banheiros, ver POP nº E 07
- 9) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.
- 10) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH.
- 11) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.

Siglas

EPI - Equipamento Proteção Individual

CCIH- Comissão Controle Infecção Hospitalar

Referências

- 01- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.
- 02- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012
- 03- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

ANEXOS

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 03/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRÃO-POP
Hospital Veterinário/UFPR**

Pop. Nº:	E 07
Vers. 01	Pag.

Rotina de Limpeza e Desinfecção nos Banheiros

Próxima Revisão:
01/2025

Objetivo: Realizar a limpeza e desinfecção corretamente, a fim de fornecer um ambiente seguro para a comunidade do HV da UFPR.

Setor: Banheiros distribuídos nos setores do HV.

Agentes: Encarregado da limpeza e Auxiliar da higiene

ETAPAS DO PROCEDIMENTO

1- Encarregada da limpeza

Orientar e equipe de higiene para realização da rotina de limpeza dos banheiros.

2- Auxiliar de higiene

Diariamente

- 01- Separar os materiais e produtos que serão utilizados.
- 02- Colocar EPI.
- 03- Sinalizar o local com placa de sinalização.
- 04 -Retirar o lixo.
- 05- Realizar limpeza dos dispensers, externamente, com pano e detergente neutro, enxaguar e secar.
- 06- Realizar limpeza e desinfecção de pias, iniciando pela parte externa (de baixo para cima) e após internamente, com detergente neutro, fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10min., enxaguar e secar.
- 07- Realizar limpeza e desinfecção das torneiras com detergente neutro, fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10 min., enxaguar e secar.
- 08- Realizar limpeza e desinfecção do box, internamente, com detergente neutro, fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10 min., enxaguar e secar.
- 09- Realizar limpeza e desinfecção do vaso sanitário, iniciando pela parte externa, com detergente neutro, fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10 min., enxaguar e secar.
- 10- Realizar a limpeza das lixeiras com fibra e detergente neutro, enxaguar e secar.
- 11- Realizar a limpeza e desinfecção do piso, com detergente neutro, fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10min., enxaguar e secar.
- 12- Realizar a limpeza e desinfecção do equipamento utilizado, com detergente neutro, fibra e saneante padronizado pela CCIH, enxaguar e secar, se for necessário.
- 13- Descartar as fibras usadas no lixo.
- 14- Encaminhar os panos para a lavanderia, a fim de serem higienizados.
- 15- Fazer a reposição de papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido e álcool 70%.
- 16- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.

Semanalmente

- 01- Separar os materiais e produtos que serão utilizados.
- 02- Colocar EPI.
- 03- Sinalizar o local com placa de sinalização.
- 04- Realizar limpeza e desinfecção do teto com pano e saneante padronizado pela CCIH. Utilizar rodo com extensor. Passar o pano em um único sentido, sempre do meio para fora. Deixar agir por 10 min., enxaguar e secar.
- 05-Realizar limpeza e desinfecção das paredes, de cima para baixo, utilizando pano e saneante

padronizado pela CCIH. Utilizar rodo com extensor. Deixar agir por 10 min., enxaguar e secar.
06- Realizar limpeza e desinfecção das portas e maçanetas, com pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10min., enxaguar, secar e passar álcool 70%.
07- Realizar desinfecção dos dispensers, interna e externamente, com pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10min., secar, passar pano com álcool 70% e identificar.
08- Realizar limpeza e desinfecção das lixeiras com fibra, pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar agir por 10min., enxaguar, secar e passar álcool 70%.
09- Realizar a limpeza e desinfecção do equipamento utilizado, com detergente neutro, fibra e saneante padronizado pela CCIH, enxaguar e secar, se for necessário.
10- Descartar as fibras usadas no lixo.
11- Encaminhar os panos para a lavanderia, a fim de serem higienizados.
12- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.

PERIODICIDADE

Diariamente: 2x/dia
Semanalmente: 1x/dia

FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

EPI, detergente neutro, saneante padronizado pela CCIH, rodo, panos de limpeza, fibra, balde, extensor, água limpa.

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

- 1) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.
- 2) O EPI deverá ser composto de uniforme, sapato, óculos e luvas próprias, fornecidos pela empresa terceirizada.
- 3) Retirar luvas assim que terminar os procedimentos.
- 4) Produtos padronizados: detergente neutro, álcool 70% e hipoclorito de sódio.
- 5) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH.
- 6) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.

Siglas


HV- Hospital Veterinário
EPI- Equipamento de Proteção Individual.
CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
ANVISA- Agência Nacional Vigilância Sanitária

Referências

- 01- ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Limpeza e Desinfecção de Superfícies. Editora ANVISA, 1ª edição. Brasília 2010.
- 02- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012.
- 03- Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto. Manual de Limpeza, desinfecção e Esterilização em Unidades de Saúde. 2006

ANEXOS


Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 11/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 08
		Vers. 01	Pag.
Rotina de Desinfecção de Armários e equipamentos do Centro Cirúrgico		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Realizar limpeza e desinfecção adequada, para eliminar possíveis bactérias e prevenir infecção hospitalar.			
Setor: Centro Cirúrgico Grandes Animais e Centro Cirúrgico Pequenos Animais		Agentes: Enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p><i>Desinfecção concorrente</i></p> <p>01- Separar os materiais e produtos que serão utilizados. 02- Colocar EPI adequado. 03- Verificar e retirar materiais e instrumentais da sala cirúrgica, caso necessário. 04- Realizar desinfecção dos equipamentos (bomba infusora, bomba seringa, respirador, foco cirurgico, etc.). 05- Descartar os panos sujos no hamper.</p> <p><i>Desinfecção terminal</i></p> <p>01- Separar os materiais e produtos que serão utilizados. 02- Colocar EPI adequado. 03- Realizar desinfecção, internamente, dos armários. 04- Realizar desinfecção dos equipamentos não utilizados durante a semana. 05- Descartar os panos sujos no hamper.</p>			
PERIODICIDADE			
A desinfecção concorrente deve ser realizada após cada término de cirurgia. A desinfecção terminal deve ser realizada 1x/semana.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI, Pano, álcool 70%			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01. 2) As atividades semanais devem seguir o cronograma de enfermagem. 3) Se o equipamento estiver com sujidade (sangue, secreções, etc.) realizar limpeza prévia, com pano úmido e detergente neutro, antes de fazer desinfecção com álcool 70%. 4) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH. 5) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.			
Siglas			
01-EPI- Equipamneto Proteção Individual 02 CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar			
Referências			

- 01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009
- 02- Brasil. Ministério da Saúde. Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar. Processamento de artigos e superfícies em estabelecimentos de saúde. Brasília: Ministério da Saúde; 2003
- 03- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. Manual de limpeza, desinfecção e esterilização de artigos em unidade de saúde de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, SP, 2002.
- 04- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.
- 05- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012

ANEXOS

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 08/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 09
		Vers. 01	Pag.
Limpeza e desinfecção em Isolamento		Próxima Revisão:	
Objetivo: Realizar limpeza e desinfecção adequada, com técnica correta, para manter ambiente limpo			
Setor: Isolamento		Agentes: Encarregado da limpeza e Auxiliar da higiene.	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>1. Encarregado da Limpeza Orientar a equipe de higiene para realização da rotina de limpeza concorrente e terminal dos ambientes</p> <p>2. Auxiliar de higiene 01- Separar os materiais e produtos que serão usados. 02- Colocar EPI 03- Realizar a limpeza nas paredes e tetos em um único sentido (de cima para baixo as paredes) e (dentro para fora o teto), utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente. 04- Realizar a limpeza de portas, caixilhos e maçaneta, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente. 05- Realizar a limpeza dos móveis, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%. 06- Realizar a limpeza das lixeiras, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e recolocar saco de lixo. 07- Realizar a limpeza dos dispensers, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%. 08- Realizar limpeza do piso, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH deixar secar naturalmente. 09- Realizar a reposição de papel toalha, álcool 70% e sabonete líquido. 10- Descartar as fibras utilizadas no lixo infectante. Realizar a limpeza do material utilizados. Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados. 11- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.</p>			
PERIODICIDADE			
A limpeza deverá ser realizada 2x/dia ou quando necessário.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI, rodo, pá, balde, panos para limpeza, fibra, placa de sinalização e produtos padronizados pela CCIH.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
<p>1) O Equipamento de Proteção Individual deverá ser composto de uniforme, sapato, óculos e luvas próprias, fornecidos pela empresa terceirizada. Avental de contato fornecido pelo Hospital veterinário.</p> <p>02) Limpar sujidade (fezes, sangue, urina, secreções) com papel toalha e descartar no lixo infectante, antes de realizar a limpeza.</p> <p>03) Antes de realizar a limpeza com saneante, fazer limpeza com detergente neutro e fibra.</p>			

- 2) Na limpeza com desinfetante, não realizar o enxague.
- 3) Na limpeza utilizar a técnica dos 2 baldes (preferencialmente de cores diferentes), que consiste em ter um balde com o produto e o outro com água limpa.
- 4) Não varrer o piso a seco, a varredura deve ser sempre úmida e, em um único sentido (nunca em vai-e-vêm) , com rodo e pano úmido, afim de evitar a dispersão de microorganismos através do pó.
- 5) Separar os panos de limpeza de superfícies móveis e fixas.
- 6) Durante a limpeza , despejar o saneante ou água do balde sobre o pano. Nunca mergulhar os panos no balde.
- 7) O produto padronizado pela CCIH: Virkon.
- 8) Encaminhar os panos para lavanderia em caso identificado como CONTAMINADO, a fim de serem lavados separados.
- 9) Os materiais para uso em isolamento devem ser exclusivos para esse ambiente.
- 10) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.
- 11) Este POP deve ser realizado em todos os ambientes, que permanecerem pacientes contaminados, que necessitaram de isolamento.
- 12) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH.
- 13) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.

Siglas

EPI - Equipamento Proteção Individual

CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Referências


01- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.

02- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012

03- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

04- CUNHA, F M B. et al. Manual de Boas Práticas para o Serviço de Limpeza - Abordagem Técnica e Prática.unesp.br. Disponível em: <<https://www.unesp.br>> Acesso em : 24/ maio de 2023.

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 24/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 10
		Vers. 01	Pag.
Limpeza e desinfecção no Setor Diagnóstico por Imagem após exames de pacientes contaminados		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Realizar limpeza e desinfecção adequada da superfície e equipamentos, a fim de descontaminar o ambiente.			
Setor: Todos os setores que realizam exames de imagem		Agentes: Encarregado da limpeza e Auxiliar da higiene.	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
1. Encarregado da Limpeza Orientar a equipe de higiene para realização da rotina de limpeza concorrente e terminal dos ambientes.			
2. Auxiliar de higiene 01- Separar os materiais e produtos que serão usados. 02- Colocar EPI. 03- Realizar a limpeza nas paredes e tetos em um único sentido (de cima para baixo as paredes) e (dentro para fora o teto), utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente. 04- Realizar a limpeza de portas, caixilhos e maçaneta, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente. 05- Realizar a limpeza dos móveis, utilizando pano e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%. 06- Realizar a limpeza das lixeiras, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e recolocar saco de lixo. 07- Lavar o piso, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente 08- Realizar a limpeza dos dispensers, utilizando fibra e saneante padronizado pela CCIH. Deixar secar naturalmente e após passar pano limpo com álcool 70%. 09- Realizar a reposição de papel toalha, álcool 70% e sabonete líquido. 10- Descartar as fibras utilizadas no lixo infectante. Realizar a limpeza do material utilizados. Encaminhar os panos para lavanderia, a fim de serem higienizados. 11- Anotar o trabalho realizado em impresso próprio.			
PERIODICIDADE			
A limpeza deverá ser realizada 2x/dia ou quando necessário.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI, rodo, pá, balde, panos para limpeza, fibra, placa de sinalização e produtos padronizados pela CCIH.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) O Equipamento de Proteção Individual deverá ser composto de uniforme, sapato, óculos e luvas próprias, fornecidos pela empresa terceirizada. Avental de contato fornecido pelo Hospital veterinário. 2) Limpar sujidade (fezes, sangue, urina, secreções) com papel toalha e descartar no lixo infectante, antes da desinfecção com saneante. 3) Na limpeza com saneante, não realizar o enxague. 4) Na limpeza utilizar a técnica dos 2 baldes (preferencialmente de cores diferentes), que consiste			

em ter um balde com o produto e o outro com água limpa.

5) Não varrer o piso a seco, a varredura deve ser sempre úmida e, em um único sentido (nunca em vaivém) , com rodo e pano úmido, afim de evitar a dispersão de microorganismos através do pó.

6) Separar os panos de limpeza de superfícies móveis e fixas.

7) Os produtos padronizados pela CCIH são: álcool 70% e Virkon.

8) Durante a limpeza , despejar o saneante ou água do balde sobre o pano, Nunca mergulhar os panos no balde.

9) Encaminhar os panos para lavanderia em caso identificado como CONTAMINADO, a fim de serem lavados separados.

10) Os materiais para uso em ambiente contaminado, devem ser exclusivos.

11) Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.

12) Este POP deve ser realizado em todos os ambientes, que passaram pacientes contaminados.

13) Estes procedimentos, são realizados conforme aval prévio da CCIH.

14) Qualquer alteração deverá ser avaliada e aprovada pela CCIH.

Siglas

EPI - Equipamento Proteção Individual

CCIH- Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Referências


01- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2010.

02- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012


03- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

04- CUNHA, F M B. et al. Manual de Boas Práticas para o Serviço de Limpeza - Abordagem Técnica e Prática.unesp.br. Disponível em: <<https://www.unesp.br>> Acesso em : 24/ maio de 2023.

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 24/05/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 11
		Vers. 01	Pag.
Organização da Central de Material		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter o ambiente em ordem facilitando o processo de trabalho da equipe de enfermagem			
Setor: Central de material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Lavar as mãos, conforme POP nº E 01. 02- Realizar desinfecção das bancadas e superfícies com álcool 70%. 03- Utilizar EPI corretamente, conforme atividade a ser desempenhada. 04- Realizar as atribuições conforme Cronograma de Atividades. 05- Solicitar auxílio do enfermeiro, quando necessário. 06- Complementar atividades não finalizadas pelo turno anterior. 07- Manter a área limpa e organizada.			
PERIODICIDADE			
Diariamente			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI, sabão líquido, papel toalha, compressas para limpeza e produtos padronizados pela CCIH.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) O Equipamento de Proteção Individual deverá ser composto de avental impermeável, luva de borracha, luva de látex, máscara, gorro e óculos 2) Comunicar o responsável quando o material ou equipamento não funcionar com eficácia. 3) O produto padronizado pela CCIH é sabão líquido e álcool 70% .			
Siglas EPI - Equipamento Proteção Individual CCIH- Comissão Controle Infecção Hospitalar			
Referências 01- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília: Anvisa, 2012 03- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009 04- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ªed. 2007			

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 20/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 12
		Vers. 01	Pag.
Limpeza de Artigos Assistência Ventilatória na Central de Material		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter os artigos livres de sujidades.			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>01- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01.</p> <p>02- Colocar EPI adequado (gorro, óculos, máscara, avental impermeável e luva borracha).</p> <p>03- Desmontar peças que apresentam articulações, encaixes ou conexões, a fim de facilitar a escovação.</p> <p>04- Realizar pré limpeza, removendo a sujidade grosseira dos artigos.</p> <p>05- Colocar o artigo em detergente enzimático previamente diluído, conforme orientação do fabricante.</p> <p>06- Retirar o instrumental do detergente enzimático (após tempo estipulado pelo fabricante) e proceder a a a limpeza manual com auxílio de escovas não abrasivas, esponja macia e torneira pressão.</p> <p>07- Enxaguar em água corrente.</p> <p>08- Realizar pré secagem com uso de ar e pano limpo/seco, que não libere fibras.</p> <p>09- Encaminhar os artigos para o processo de desinfecção em solução de hipoclorito por 30 min.</p> <p>10- Retirar os artigos da solução de hipoclorito, enxaguando em água corrente com auxílio de torneira com pressão.</p> <p>11- Secar os artigos com ar e pano limpo que não libere fibras.</p> <p>12- Realizar a inspeção dos artigos com uma lupa, a fim de verificar a qualidade da limpeza. Refazer o processo se necessário.</p> <p>13- Levar os artigos em condições de uso para sala preparo e esterilização de materiais.</p> <p>14- Separar os artigos danificados e comunicar a enfermeira.</p> <p>15- Realizar lavagem, secagem, retirada e guarda da luva borracha.</p> <p>16- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01.</p>			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI (gorro, óculos, máscara/face shield, avental impermeável e luva de borracha), escovas não abrasivas, esponja macia, água corrente, detergente enzimático, recipiente com tampa, lupa, pano limpo, torneira de pressão, hipoclorito de sódio.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
<p>1) A solução de detergente enzimático deve ser diluído conforme POP n° E 30</p> <p>2) O tempo do material no detergente enzimático deve seguir a orientação do fabricante.</p> <p>3) A solução de hipoclorito deve ser à 0,5%, diluir conforme POP n° E 29.</p> <p>4) Os materiais devem ficar imersos em solução de água com detergente neutro, antes da pré lavagem a fim de evitar biofilme.</p> <p>5) Diluir o detergente neutro conforme POP n° E 31.</p> <p>6) Os artigos devem ser levados até a sala de preparo em recipiente com tampa.</p> <p>7) A inspeção dos artigos deve ser realizada em uma bancada forrada com pano limpo, que não liberem fibras.</p> <p>8) Após a desinfecção dos artigos, estes deverão ser embalados em sacos plásticos, com identificação da data de realização do processo, data de validade (7 dias) e responsável pelo procedimento;</p>			

- 9) Armazenar em armários separados dos materiais estéreis;
10) Em caso de falha no processo, comunicar a enfermeira.

Siglas

EPI - Equipamento Proteção Individual

POP- Procedimento Operacional Padrão


Referências

01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007

03- BRASIL. Secretaria Saúde. Manual de Processamento para Produtos para Saúde. Brasília 2020.

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 20/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 13
		Vers. 01	Pag.
Limpeza de Artigos cirúrgicos na Central de Material		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter os artigos livres de sujidade			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>01- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01.</p> <p>02- Colocar EPI adequado (gorro, óculos, máscara, avental impermeável e luva borracha).</p> <p>03- Desmontar peças que apresentam articulações, encaixes ou conexões, a fim de facilitar a limpeza.</p> <p>04- Realizar pré limpeza, removendo a sujidade grosseira dos artigos, externamente.</p> <p>05- Colocar o artigo na lavadora ultrassônica, para limpeza.</p> <p>06- Retirar o artigo da lavadora ultrassônica (após término do processo)</p> <p>07- Realizar secagem com pano limpo e seco, que não liberem fibras.</p> <p>08- Realizar a inspeção dos artigos com uma lupa, a fim de verificar a qualidade da limpeza. Refazer o processo se necessário.</p> <p>09- Levar os artigos em condições de uso para sala preparo e esterilização de materiais.</p> <p>10- Separar os artigos que estejam com ferrugem ou danificados, encaminhando para manutenção ou Descarte.</p> <p>11- Realizar lavagem, secagem, retirada e guarda da luva borracha.</p> <p>12- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01.</p>			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI (gorro, óculos, máscara/face shield, avental impermeável e luva de borracha), esponja macia, escovinha de cerdas macias, água corrente, lavadora ultrassônica,detergente enzimático, hipoclorito de sódio, recipiente com tampa,lupa,pano limpo,			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
<p>1) O detergente enzimático é diluído conforme programa da lavadora ultrassônica, POP n° E 26.</p> <p>2) Os artigos devem previamente ficar imersos em solução de água com detergente neutro, a fim de evitar biofilme.</p> <p>3) Diluir o detergente neutro conforme POP n° E 31</p> <p>4) Os artigos devem ser levados até a sala de preparo em recipiente com tampa.</p> <p>5) A inspeção dos artigos, deve ser realizada em uma bancada forrada com campo limpo, que não libere fibras.</p> <p>6) Em caso de falha no processo, comunicar a enfermeira.</p>			
<p>Siglas</p> <p>EPI - Equipamento Proteção Individual</p> <p>POP- Procedimento Operacional Padrão</p>			

Referências

01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 21/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. Nº:	E 14
		Vers. 01	Pag.
Limpeza de Artigos canulados na Central de Material		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter os artigos livres de sujidade			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>01- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.</p> <p>02- Colocar EPI adequado (gorro, óculos, máscara, avental impermeável e luva borracha).</p> <p>03- Desmontar peças que apresentam articulações, encaixes ou conexões, a fim de facilitar a limpeza.</p> <p>04- Realizar pré limpeza, removendo a sujidade grosseira dos artigos, externamente.</p> <p>05- Colocar o artigo na lavadora ultrassônica, para limpeza.</p> <p>06- Retirar o artigo da lavadora ultrassônica (após término do processo)</p> <p>07- Realizar pré secagem com uso ar e pano limpo/seco, que não liberem fibras</p> <p>08- Encaminhar os artigos para o processo de desinfecção em solução de hipoclorito por 30 min.</p> <p>10- Retirar os artigos da solução de hipoclorito, enxaguando em água corrente com auxílio de torneira com pressão.</p> <p>11- Secar os artigos com ar e pano limpo que não libere fibras.</p> <p>12- Realizar a inspeção dos artigos com uma lupa, a fim de verificar a qualidade da limpeza. Refazer o processo se necessário.</p> <p>13- Levar os artigos em condições de uso para sala preparo e esterilização de materiais.</p> <p>14- Separar os artigos danificados e comunicar a enfermeira.</p> <p>15- Realizar lavagem, secagem, retirada e guarda da luva borracha.</p> <p>16- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.</p>			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI (gorro, óculos, máscara/face shield, avental impermeável e luva de borracha), esponja macia, escovinha de cerdas macias, água corrente, lavadora ultrassônica, detergente enzimático, hipoclorito de sódio, recipiente com tampa, lupa e pano limpo.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
<p>1) O detergente enzimático é diluído conforme programa da lavadora ultrassônica, POP nº E 26.</p> <p>2) A solução de hipoclorito deve ser à 0,5%, diluir conforme POP nº E 29.</p> <p>3) Os artigos devem previamente ficar imersos em solução de água com detergente neutro, a fim de evitar biofilme.</p> <p>4) Diluir o detergente neutro conforme POP nº E 31.</p> <p>5) Os artigos devem ser levados até a sala de preparo em recipiente com tampa.</p> <p>6) A inspeção dos artigos, deve ser realizada em uma bancada forrada com campo limpo, que não libere fibras.</p> <p>7) Após a desinfecção dos artigos, estes deverão ser embalados em sacos plásticos, com identificação da data de realização do processo, data de validade (7 dias) e responsável pelo procedimento.</p> <p>8) Armazenar em armários separados dos materiais estéreis.</p> <p>9) Em caso de falha no processo, comunicar a enfermeira.</p>			


Siglas

EPI - Equipamento Proteção Individual
POP- Procedimento Operacional Padrão


Referências

01- Ministério da Saúde. PORTARIA N° 3.012, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2009
02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007


Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 21/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 15
		Vers. 01	Pag.
Preparo e Empacotamento dos Artigos		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter os artigos com proteção adequada, sem risco de contaminação			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01. 02- Colocar EPI adequado (gorro) 03- Inspeccionar os artigos, verificando limpeza, integridade e funcionalidade. 04- Escolher a embalagem de acordo com o material e o processo. 05- Identificar a embalagem com: nome do produto, lote, data esterilização, data validade e nome de quem Preparou. 06- Realizar a selagem das embalagens corretamente de acordo com o tipo de processo. 07- Observar que as embalagens estejam seladas. 08- Colocar fita zebraada nas embalagens que irão para autoclave. 09- Encaminhar os artigos para esterilização. 10- Encaminhar os artigos tubulares para o armário. 11- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01.			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI (gorro), lupa, pano limpo, papel grau cirúrgico, saco de papel transparente, seladora, fita zebraada, etiqueta, etiquetadora.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) Avaliar a necessidade de embalagem dupla. 2) Realizar o ajuste perfeito das embalagens duplas, observando que não fiquem dobradas. 3) Realizar as identificações em fita ou etiqueta própria, colando-a na porção plástica.. 4) Não realizar as anotações diretamente no invólucro. 5) Em caso de falha no processo, comunicar a enfermeira.			
Siglas			
EPI - Equipamento Proteção Individual			
POP- Procedimento Operacional Padrão			
Referências			
01- Ministério da Saúde. PORTARIA N° 3.012, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2009			
02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			


Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 21/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. Nº:	E 16
		Vers. 01	Pag.
Carregamento dos Artigos na Autoclave		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Realizar esterilização adequada dos artigos, através da correta circulação do agente esterilizante.			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01. 02- Estar com EPI adequado (gorro) 03- Ligar a autoclave, segundo POP nº E 23 e POP nº E 24. 04- Inspeccionar as embalagens dos artigos, verificando integridade. 05- Carregar a autoclave, utilizando somente 80% da sua capacidade. 06- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI (gorro), autoclave.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) Colocar os pacotes na posição vertical, a fim de facilitar a entrada e a circulação do vapor. Essa posição também facilita a secagem da carga. 2) Não apertar muito os pacotes, a fim de ajudar a penetração do vapor. 3) Não encostar os pacotes nas paredes da câmara. 4) Os artigos côncavos devem ser colocados com a abertura voltada para baixo. 5) Deixar um espaço mínimo de 2cm entre um pacote e outro.			
Siglas EPI - Equipamento Proteção Individual POP- Procedimento Operacional Padrão			
Referências 01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009 02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 25/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 25/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 17
		Vers. 01	Pag.
Esterilização dos Artigos na Autoclave		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Realizar esterilização adequada dos artigos, eliminando os microrganismos com segurança.			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01. 02- Estar com EPI adequado. 03- Realizar o funcionamento da autoclave, segundo POP n° E 23 POP n° E 24. 04- Inspeccionar o funcionamento de todo ciclo da autoclave, a fim de verificar possíveis irregularidades. 05- Aguardar a saída do vapor, após o término do ciclo. 06- Entreabrir a porta. 07- Aguardar o material esfriar. 08- Colocar EPI. 09- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01. 10- Retirar o material da autoclave, verificando se o indicador mudou de cor. 11- Encaminhar o material para o armário. 12- Anotar os parâmetros em impresso próprio. 13- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01.			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI (gorro, luva térmica, máscara), autoclave.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
1) Não colocar os pacotes em superfície fria, após a esterilização. 2) Os pacotes devem estar completamente frios antes de serem manipulados e retirados da autoclave. 3) Evitar cargas mistas (campo e instrumental), quando necessário, colocar os campos acima. 4) Seguir as normas de funcionamento do equipamento 5) Em caso de falha no processo, comunicar à enfermeira.			
Siglas EPI - Equipamento Proteção Individual POP- Procedimento Operacional Padrão			
Referências 01- Ministério da Saúde. PORTARIA N° 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009 02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 25/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 18
		Vers. 01	Pag.
Armazenamento dos Artigos esterilizados		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter a integridade da esterilização			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01. 02- Verificar a integridade das embalagens dos artigos esterilizados 03- Encaminhar os artigos esterilizados para local de armazenamento. 04- Estocar os pacotes esterilizados por data de validade. 05- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01.			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Recipiente com tampa, armário			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- Manusear os pacotes quando estiverem completamente frios. 02- Estocar os artigos em local adequado, separadamente de itens não estéreis. 03- Transportar os artigos em recipiente com tampa, protegendo de contaminação e danos a embalagem. 04- Considerar contaminado os artigos que caírem no chão ou tiverem suas embalagens danificadas. 05- Não encostar os pacotes esterilizados nas paredes dos armários. 06- Guardar e distribuir os artigos por ordem cronológica. 07- Efetuar inspeção periódica dos itens estocados para verificação de qualquer comprometimento na esterilização. 08- Efetuar inspeção periódica, a fim de conferir validade dos produtos. 09- Realizar limpeza dos armários, conforme cronograma. 10- Manusear os pacotes esterilizados o mínimo possível e com cuidado, pois a manutenção da esterilização é um evento dependente.			
Siglas			
EPI - Equipamento Proteção Individual			
POP- Procedimento Operacional Padrão			
Referências			
01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009			
02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			
Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 26 /09/2023	
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025	
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025	


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. Nº:	E 19
		Vers. 01	Pag.
Monitoramento Mecânico do Processo de Esterilização		Próxima Revisão:	
Objetivo: Manter adequado funcionamento do equipamento de esterilização.			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
Manutenção Preventiva			
01- Seguir cronograma estipulado previamente.			
Manutenção Corretiva			
Enfermagem			
01- Identificar o problema.			
02- Comunicar o enfermeiro para que seja chamado manutenção			
03- Anotar em impresso os itens abaixo:			
Data da ocorrência;			
Problema identificado no equipamento;			
Nome do enfermeiro a ser comunicado da ocorrência para solicitar a manutenção do equipamento;			
Nome do técnico e da empresa responsáveis pela execução da manutenção;			
Enfermeira:			
Imprimir o e-mail de manutenção corretiva e anexar em impresso próprio;			
Anexar cópia da descrição do serviço (nota emitida pelo técnico).			
PERIODICIDADE			
Sempre que houver manutenção			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Impresso, caneta, telefone			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- Deverão ser realizados dois testes biológicos de 3 horas seguidos, sem carga, registrando a realização dos mesmos no impresso de segurança da autoclave e no impresso padronizado para monitoramento químico e biológico;			
02- A manutenção preventiva deverá ser feita respeitando o cronograma, e a corretiva sempre que necessário, devendo serem registradas no referido impresso. A documentação fornecida pela empresa responsável pela manutenção preventiva também deverá ser anexada no mesmo, facilitando o acompanhamento do equipamento.			
Siglas			
POP- Procedimento Operacional Padrão			

Referências

01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 26/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 20
		Vers. 01	Pag.
Monitoramento Físico do Processo de Esterilização		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter adequado funcionamento do equipamento de esterilização.			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Anotar em impresso próprio os parâmetros de tempo, temperatura e pressão do processo de esterilização			
PERIODICIDADE			
A cada esterilização.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Impresso, caneta, autoclave.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- Em caso de falha do equipamento, comunicar a Enfermeira.			
Siglas POP- Procedimento Operacional Padrão			
Referências 01- Ministério da Saúde. PORTARIA N° 3.012, DE 1° DE DEZEMBRO DE 2009 02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			
Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 26/09/2023	
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025	
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 21
		Vers. 01	Pag.
Monitoramento Químico do Processo Esterilização		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Conferir adequada esterilização dos artigos			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>Indicador Químico classe I (Fita zebra)</p> <p>01- Colocar em todos os pacotes (exceto papel grau cirúrgico) um pedaço de fita zebra. 02- conferir a viragem deste indicador na retirada do material da autoclave.</p> <p>Indicador químico classe IV</p> <p>01- Colocar em todos os pacotes e caixas cirúrgicas que serão esterilizados em autoclave. 02- colocar em pacote teste e esterilizando junto com os outros artigos. 03- Retirar do pacote teste, após término da esterilização e completamente frio . 04- Verificar se houve mudança de cor. 05- Fixar em impresso próprio</p> <p>Indicador Químico classe V</p> <p>01- Colocar em todos os pacotes e caixas cirúrgicas, que serão esterilizados em autoclave, em cada Carga (ciclo). 02- Colocar em pacote desafio junto com indicador biológico. 03- Retirar pacote desafio da autoclave, após término da esterilização e completamente frio. 04- Verificar se houve mudança de cor. 05- Fixar em impresso próprio.</p>			
PERIODICIDADE			
Diariamente			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Indicador químico classe I, classe IV e classe V			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- O papel grau cirúrgico já apresenta o indicador químico classe I. 02- Caso o indicador químico classe I não esteja presente no pacote ou não tenha apresentado a viragem, o material não deve ser utilizado. 03- Indicador químico classe IV considera os parâmetros na autoclave de: tempo, temperatura e presença de vapor.			

04- Indicador químico classe V considera os parâmetros de tempo, temperatura e presença de vapor tendo como base o indicador biológico.

05- Para garantir a monitorização pelo indicador químico classe V, deverá haver uma avaliação do seu desempenho, comparando com o teste do indicador biológico.

06- I indicador químico classe V deve ser colocado em um pacote a cada ciclo da autoclave.

07- Em cada ciclo fazer um pacote com 1 indicador químico classe IV e um indicador químico classe V, os quais serão armazenados em ficha própria.

Siglas


POP- Procedimento Operacional Padrão

Referências

01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 26/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. Nº:	E 22
		Vers. 01	Pag.
Monitoramento Biológico do Processo de Esterilização		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Conferir adequada esterilização dos artigos			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe de enfermagem.	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>Antes do primeiro ciclo do dia</p> <p>01- Separar 2 ampolas (mesmo fabricante e mesmo lote). 02- Ligar incubadora na rede elétrica, a qual deve ficar ligada durante todo período de incubação. 03- Colocar 1 indicador biológico dentro do pacote com o material para esterilizar, se a carga tiver pacotes diferente, colocar naquele com maior dificuldade de penetração do vapor. 04- Fechar autoclave. 05- Iniciar esterilização.</p> <p>Após o término do primeiro ciclo</p> <p>06- Abrir o material esterilizado e pegar a ampola teste autoclavada. 07- Aguardar 15 minutos para o resfriamento e e despressurização da ampola. 08- Verificar se a mini-incubadora está ligada e aquecida. 09- Colocar 1/3 da ampola teste dentro do orifício da incubadora, virando-a para ativar, com isso a ampola quebrará e haverá contato do meio cultura com os esporos. 10- Retirar a ampola do orifício da incubadora e dar umas batidas de leve (com o dedo) na parte inferior da mesma, a fim de que ocorra 100% contato do meio de cultura com os esporos. 11- Repetir a mesma operação do item 10 com a ampola controle (que não foi autoclavada). 12- Colocar as ampolas para incubar, pelo tempo determinado pelo fabricante (6, 12 ou 24 horas). 13- Fazer a 1ª leitura no final do turno manhã. 14- Fazer a 2ª leitura no final do turno da tarde 15- Fazer a última leitura em 24 horas da 1ª leitura. 16- Realizar o registro de cada leitura em impresso próprio.</p>			
PERIODICIDADE			
Diariamente			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Indicador biológico, caneta, impresso, estufa			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
<p>01- Resultado aprovado: A ampola teste apresenta coloração roxa e a ampola controle coloração amarela.</p> <p>02- Resultado Reprovado: A ampola teste e a ampola controle, ambas apresentam coloração amarela o que significa que ocorreu crescimento bactérias.</p> <p>03- Resultado inconclusivo: A ampola teste e a ampola controle, ambas apresentam coloração roxa o que não é possível afirmar se ocorreu a esterilização. As causas podem ser: ampola não ativada adequadamente; Incubadora não funcionando adequadamente ou desligada; Falha no</p>			

transporte, armazenamento ou na fabricação do indicador.

04- Para o descarte das ampolas:

Envolver a ampola controle em algodão e fita crepe, colocar em envelope de papel grau cirúrgico e autoclavar.

Se a ampola teste ficar na coloração amarela, colocar junto com a ampola controle e autoclavar.

Após autoclavar, descartar as 2 ampolas (teste e controle) no lixo tipo D (lixo comum).

Siglas

POP- Procedimento Operacional Padrão

Referências

01- Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 3.012, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2009

02- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 26/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025



**PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-
POP
Hospital Veterinário/UFPR**

Pop. E 23
Nº:
Vers. 01
Pag.

Funcionamento Autoclave Horizontal - Linha 2000/3000



Próxima Revisão:
01/2025

Objetivo: Manusear corretamente o equipamento

Sector: Central Material

Agentes: Equipe de enfermagem

ETAPAS DO PROCEDIMENTO

- 01- Ligar o interruptor **ENERGIZAÇÃO** na parte frontal do equipamento.
- 02- Aguardar que o **MANÔMETRO** no painel atinja 2,5.
- 03- Colocar a carga que será esterilizada.
- 04- Ligar a chave (para cima: **LIGA** e para baixo: **DESLIGA**).
- 05- Acionar uma vez a tecla **INICIO** assim que aparecer a palavra **PAUSA** no painel.
- 06- Acionar uma vez a tecla  (**SETA HORIZONTAL**).
- 07- Selecionar o programa desejado, 1 à 5 pelas setas  (**SETA VERTICAL**).
- 08- Acionar uma vez a tecla **INÍCIO** indicada no cristal **PRONTO**.
- 09- Acionar o botão **PARTIDA** e seu funcionamento será automático.

PERIODICIDADE

Diariamente

FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS

Autoclave.

OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES

01-DISPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS PARA ESTERILIZAÇÃO

MATERIAL	TEMPERATURA	TEMPO
PACOTES PEQUENOS	134°C	4 MINUTOS
PACOTES GRANDES	134°C	10 MINUTOS
PACOTES GRANDES -ESPESSURA	121°C	30 MINUTOS
SUPERFÍCIE	121°C	15 MINUTOS
LÍQUIDOS	121°C	30 MINUTOS

02- Realizar limpeza da autoclave, conforme cronograma de acordo com o POP nº25.

03- Em caso de falha , comunicar a enfermeira


Siglas


POP- Procedimento Operacional Padrão


Referências

01- Manual do equipamento.


Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 26/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 24
		Vers. 01	Pag.
Funcionamento Autoclave Vertical - AV75		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manusear corretamente o equipamento			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
<p>01- Ligar chave geral (lateral esquerda). * PAINEL LCD ACENDERÁ** 02- Colocar 4 litros água destilada dentro da cuba 03- Colocar material no cesto 04- Fechar a porta girando manípulo até encostar 05- Abrir a porta quando aparecer a palavra FIM e retirar o material</p> <p>OBS: PARA INICIAR NOVO CICLO, COMPLETAR A ÁGUA!</p>			
PERIODICIDADE			
Eventualmente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Autoclave, luva térmica			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
<p>01- Painel de LCD : botões (S) e (E) * APERTAR BOTÃO (E) - TEMPERATURA 121°C * APERTAR BOTÃO (E) - TEMPO ESTERILIZAÇÃO 30 MIN * APERTAR BOTÃO (E) - INICIAR CICLO</p> <p>02- Completar água a cada ciclo 03- Nunca funcionar sem o cesto de baixo 04- Não forçar o manípulo 05- OBS: PARA INICIAR NOVO CICLO, COMPLETAR A ÁGUA!! 06- Realizar limpeza da autoclave, conforme cronograma de acordo com o POP nº25. 07- Em caso de falha, comunicar a enfermeira</p> <p>Siglas POP- Procedimento Operacional Padrão LCD- Tipo de tela</p> <p>Referências</p> <p>01- Manual do equipamento.</p>			
Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 27/09/2023	
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025	
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025	


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. Nº:	E 25
		Vers. 01	Pag.
Limpeza Autoclave		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Manter a qualidade dos procedimentos de esterilização			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos, conforme POP nº E 01 02- Utilizar EPI adequado. 03- Verificar se o equipamento está frio e desligado. 04- Calçar luvas de borracha. 05- Retirar bandejas/cestos 05- Embeber esponja com sabão líquido. 06- Lavar toda a superfície da câmara interna com água e sabão líquido. 07- Remover o sabão líquido com pano limpo umedecido em água limpa. 08- Repetir a operação até remover todo o sabão. 09- Secar com pano limpo e seco. 10- Repetir procedimento externamente e nas bandeja/cestos. 11- Recolocar bandejas/cestos 12- Realizar a higienização das mãos, conforme POP nº E 01			
PERIODICIDADE			
Semanalmente, conforme cronograma			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Autoclave, EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental), recipiente plástico, água, sabão líquido neutro, esponja, pano úmido limpo, pano seco limpo.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- Utilizar uma haste para alcançar a parte mais profunda da autoclave. 02- A limpeza externamente, deve ser feita diariamente 03- Em caso de falha no processo, comunicar a enfermeira			
Siglas			
POP- Procedimento Operacional Padrão			
EPI- Equipamento proteção individual			
Referências			
01- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			
02-BARILLI, A.L.A.; NASCIMENTO G.M.; PEREIRA, M.C.A., et.al. Manual de qualificação de esterilização em autoclaves - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SMS/CCII/SUS – SP 2009			
Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 27/09/2023	
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025	
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO- POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 26
		Vers. 01	Pag.
Limpeza Artigos Cirúrgicos na Lavadora Ultrassônica		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Garantir limpeza eficiente dos artigos			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos , conforme POP nº E 01 02- Utilizar EPI adequado. 03- Abrir tampa lavadora. 04- Colocar o artigo cirúrgico no cesto. 05- Adaptar o cesto corretamente. 06- Fechar a tampa. 07- Escolher programa desejado. 08- Acionar programa desejado. 09- Retirar artigo, após término do processo. 10- Encaminhar artigos para próximas etapas, conforme POP's E 13, E 15, E 16, E 17 e E 18 11- Realizar a higienização das mãos, conforme POP nº E 01			
PERIODICIDADE			
Diariamente			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Água, Lavadora ultrassônica, Detergente enzimático, EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental impermeável).			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01-Remover o excesso de sujidade do material com limpeza manual prévia. 02- As caixas a serem lavadas devem ser do tipo perfuradas. 03-Os instrumentais devem estar abertos/desmontados. 04- Dispor artigos mais pesados no fundo do cesto e sobre estes os mais leves. 05- Não sobrecarregar a cuba. 06- Ocupar no máximo 75% da capacidade total. 07- Não acrescentar ou retirar materiais da lavadora durante o processamento do ciclo.			
Siglas			
POP- Procedimento Operacional Padrão			
EPI- Equipamento proteção individual			
Referências			
01- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			
02- ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC ° 15, de 15 de março de 2012.			


Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 28/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025


	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 27
		Vers. 01	Pag.
Limpeza Artigos Canulados na Lavadora Ultrassônica		Próxima Revisão: Conselho Hospitalar	
Objetivo: Garantir limpeza eficiente dos artigos			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos , conforme POP nº E 01. 02- Utilizar EPI adequado. 03- Abrir tampa lavadora. 04- Colocar os artigos canulados nos respectivos adaptadores. 05- Fechar a tampa. 07- Escolher programa desejado. 08- Acionar programa desejado. 09- Retirar artigo, após término do processo. 10- Encaminhar artigos para próximas etapas, conforme POP's E 14 e E 15. 11- Realizar a higienização das mãos, conforme POP nº E 01.			
PERIODICIDADE			
Diariamente.			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Água, Lavadora ultrassônica, Detergente enzimático, EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental impermeável).			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01-Remover o excesso de sujidade do material com limpeza manual prévia. 02- Instrumentais com lumens de diâmetro inferior a 5 mm é obrigatório que a fase automatizada da limpeza seja feita em lavadora ultrassônica, com conectores para canulados que utilize tecnologia de fluxo intermitente. 06- Ocupar no máximo 75% da capacidade total. 07- Não acrescentar ou retirar materiais da lavadora durante o processamento do ciclo.			
Siglas POP- Procedimento Operacional Padrão EPI- Equipamento proteção individual			
Referências 01- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007 02- ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC ° 15, de 15 de março de 2012.			


Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 28/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. Nº:	E 28
		Vers. 01	Pag.
Limpeza da Lavadora Ultrassônica		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: garantir funcionamento adequado livre de sujidades que possam interferir no processo de limpeza.			
Setor: Central Material		Agentes: Equipe de enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos , conforme POP nº E 01 02- Utilizar EPI adequado. 03- Verificar se o equipamento está desligado e frio. 04- Retirar os cestos da lavadora. 05- Lavar os cestos separadamente com esponja e sabão líquido. 06- Enxaguar os cestos em água corrente. 07- Deixar os cestos escorrendo a água sobre uma superfície limpa e forrada com pano limpo. 08- Realizar limpeza interna da lavadora ultrassônica com pano, água e sabão neutro líquido. 09- Retirar o sabão com auxílio de pano e água. 10- Repetir o procedimento do item 09 quantas vezes forem necessários. 11- Secar cestos e lavadora com pano seco e limpo. 12- Recolocar os cestos, encaixando-os corretamente 13- Limpar lavadora, externamente, com pano e sabão. 14- Retirar todo sabão, externamente , com pano e água. 15- Secar lavadora, externamente, com pano limpo e seco 10- Realizar a higienização das mãos, conforme POP nº E 01			
PERIODICIDADE			
Diariamente			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
EPI (gorro, máscara, luva de borracha , óculos de proteção e avental impermeável de manga longa), água, sabão líquido, esponja não abrasiva, pano de limpeza, lavadora ultrassônica.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- É imprescindível o uso de EPI 02-A limpeza deve ser realizada diariamente no final de cada turno (manhã e tarde), ou antes se o material lavado estiver com muita sujidade. 03- Manter lavadora seca, quando não estiver em uso.			
Siglas			
POP- Procedimento Operacional Padrão			
EPI- Equipamento proteção individual			
Referências			
01- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			
02- ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC ° 15, de 15 de março de 2012.			
03- GRAZIANO, K.U; SILVA, A; PSALTIKIDIS, E.M. Enfermagem em Centro de Material e esterilização. Barueri, SP: Manole, 1º ed 2011			

Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 29/09/2023
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 29
		Vers. 01	Pag.
Manuseio do Hipoclorito		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Garantir desinfecção eficiente dos artigos			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos , conforme POP nº E 01 02- Utilizar EPI adequado. 03- Preparar a solução desinfetante de hipoclorito a 0,5% em recipiente exclusivo, opaco e com tampa. 04- Preencher a ficha, para controle processo de desinfecção. 05- Imergir as peças no recipiente com solução de hipoclorito a 0,5%. 06-Deixar os artigos em solução por 30 minutos. 07- Retirar os artigos após tempo estipulado. 08- Realizar os próximos processos de acordo com o material seguindo os POP's E 12 e E 14. 09- Desprezar a solução de hipoclorito. 10- Lavar o recipiente com esponja e sabão líquido. 11- Secar o recipiente, deixando-o apto para novo uso.			
PERIODICIDADE			
Diariamente			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Água, hipoclorito sódio, EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental impermeável), recipiente opaco com tampa, pano limpo, sabão líquido, esponja.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- Diluir hipoclorito 2% deixando-o 0,5% ou seja: 1 litro hipoclorito diluir em 3 litros de água. 02- Cronometrar o tempo do artigo após a colocação do último material. 03- Não acrescentar ou retirar materiais da solução durante o tempo estipulado. 04- Presença de resíduos de hipoclorito nos artigos assistência ventilatória pode causar irritação na mucosa respiratória.			
Siglas POP- Procedimento Operacional Padrão EPI- Equipamento proteção individual			
Referências 01- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007 02- ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC ° 15, de 15 de março de 2012.			
Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 29/09/2023	
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025	
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR	Pop. N°:	E 30
		Vers. 01	Pag.
Manuseio do Detergente Enzimático		Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Garantir limpeza eficiente dos artigos			
Sector: Central Material		Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO			
01- Realizar higienização das mãos, conforme POP n° E 01 02- Utilizar EPI adequado. 03- Preparar a solução desinfetante de detergente enzimático em recipiente exclusivo, conforme orientação do fabricante. 04- Preencher a ficha, para controle processo de limpeza 05- Imergir as peças no recipiente com detergente enzimático. 06- Deixar os artigos em solução conforme orientação do fabricante. 07- Retirar os artigos após tempo estipulado. 08- Realizar os próximos processos de acordo com o material seguindo o POP n° E 12 09- Desprezar a solução de detergente enzimático, imediatamente após o uso. 10- Lavar o recipiente com esponja e sabão líquido. 11- Secar o recipiente, deixando-o apto para novo uso.			
PERIODICIDADE			
Diariamente			
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS			
Água, detergente enzimático, EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental impermeável), recipiente com tampa, pano limpo, sabão líquido, esponja.			
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES			
01- Verificar o modo de diluição, o prazo de validade após a diluição, o tempo de imersão, temperatura da água e o método de utilização do produto, conforme recomendações do fabricante. 02- Cronometrar o tempo do artigo após a colocação do último material. 03- Não acrescentar ou retirar materiais da solução durante o tempo estipulado. 04- Não deixar o artigo imerso na solução por tempo excessivo, pois pode favorecer a formação de biofilme. 05- O uso do detergente enzimático não substitui a fricção dos artigos durante o processo de limpeza.			
Siglas			
POP- Procedimento Operacional Padrão			
EPI- Equipamento proteção individual			
Referências			
01- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007			
02- ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC ° 15, de 15 de março de 2012.			
Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 29/09/2023	
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025	
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025	

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO-POP Hospital Veterinário/UFPR		Pop. Nº:	E 31
			Vers. 01	Pag.
Manuseio do Detergente Neutro			Próxima Revisão: 01/2025	
Objetivo: Garantir limpeza eficiente dos artigos				
Setor: Central Material			Agentes: Equipe enfermagem	
ETAPAS DO PROCEDIMENTO				
01- Realizar higienização das mãos , conforme POP nº E 01 02- Utilizar EPI adequado. 03- Preparar a solução desinfetante de detergente neutro, em recipiente exclusivo, na diluição de 1 litro detergente para 5 litros de água. 04- Imergir as peças no recipiente com detergente neutro. 05- Deixar os artigos em solução até o momento da pré lavagem. 06- Realizar os próximos processos de acordo com o material conforme os POP's nº E 12, E 13 e E 14. 09- Desprezar a solução de detergente neutro, imediatamente após o uso. 10- Lavar o recipiente com esponja e sabão líquido. 11- Secar o recipiente, deixando-o apto para novo uso.				
PERIODICIDADE				
Diariamente				
FORMULÁRIOS UTILIZADOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS				
Água, detergente neutro, EPI (gorro, luva de borracha, óculos de proteção, avental impermeável), recipiente com tampa, pano limpo, sabão líquido e esponja.				
OBSERVAÇÕES - CONSIDERAÇÕES				
01-Verificar o modo de diluição, diluir 1 litro de detergente neutro para 5 litros de água. 02- Deixar os artigos imersos até o momento da pré lavagem Siglas POP- Procedimento Operacional Padrão EPI- Equipamento proteção individual Referências 01- SOBECC. Práticas recomendadas. 4ª ed. 2007 02- ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 15, de 15 de março de 2012.				
Elaborado por:	Enfermeira Ana Paula Pinto Schittini	Data da Criação: 02/10/2023		
Revisado por:	MV Thiago Francisco Costa Solak	Data de Revisão: 27/01/2025		
Aprovado por:	Conselho Hospitalar	Data de Aprovação: 28/01/2025		

